


Puntos terapéuticos para dolor o disfunción mandibular (ATM) [según los protocolos de Wat Pho, Bangkok, Tailandia]

Cara-8
1 dedo directamente bajo Cara-9 • justo por debajo del nivel del lóbulo de la oreja
• 1 dedo anterior hasta el borde posterior de la mandíbula • encuentra un pequeño músculo rígido (risorio)

Cara-9 (ST-7)
en una depresión poco profunda debajo del hueso de la mejilla (arco cigomático) • cuando la boca se abre ampliamente esta depresión desaparece • 1 dedo anterior al oído • deslice la punta de su dedo desde la nariz por debajo del hueso de la mejilla, parando 1 dedo antes de la oreja • anterior al cóndilo mandibular • irradia a los dientes, la boca, la nariz, los ojos y la sien.



Apófisis mastoideas (GB-12)
posterior e inferior al borde inferior de la apófisis mastoideas • presione el músculo esternocleidomastoideo -ECOM.

Cara-6
en el borde posterior de la mandíbula • arriba de Cara -5 • coloque el dedo o la punta del pulgar entre la mandíbula y el músculo ECOM y presione el hueso

Cara-7 (TW-17)
en la depresión entre la mandíbula y el ECOM • justo debajo del nivel de la apófisis mastoideas • presione hacia la mandíbula

Cara-5
en el ángulo posterior de la mandíbula o ligeramente por encima • deslice su pulgar o la yema del dedo entre la mandíbula y el ECOM y tire del hueso lateralmente (lejos del cliente) mientras el cliente resiste